

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES
DANS LES SERRES DU MUSÉUM PENDANT L'ANNÉE 1953.

PAR A. GUILLAUMIN et H. ROSE¹.

DICOTYLÉDONES.

- Adromischus fusiformis* Berger.
Aylostera Fiebregii Backeb.
— *Spegazziniana* Backeb.
Bauhinia purpurea L.
Begonia carpinifolia Liebm.
— *intermedia* Irmsch.
Conophytum flavum N. E. Br.
— *obcordellum* N. E. Br.
— *petraeum* N. E. Br.
— *velutinum* Schwant.
Delosperma Cooperi L. Bol.
— *macellum* N. E. Br.
— *saturatum* L. Bol.
— *Sutherlandii* N. E. Br.
— *Wethamsae* L. Bol.
Echeveria carnicolor Morr.
— *gibbiflora* DC. var. *metallica* Bak.
Eranthemum aspersum Hook f.
Euphorbia heptagona Haw. non L.
— *Ledienii* Berger.
— *mahajalensis* Denis, Madagascar (*Léandri* f. 180, 1953).
Euphorbia onoclada Drake, Madagascar (*Boiteau* f. 72, 1946).
— *stellaespina* Haw.
Flacourtia cataphracta Roxb. ex Willd.
Frailea asterioides Werderm.
— *pumila* Britt. et Rose.
Glottiphyllum album. L. Bol. ex Jacobs.
— *fragrans* Schwant.
— *Herrei* L. Bol.
— *Muirii* N. E. Br.
— *oligocarpum* L. Bol.
— *parvifolium* L. Bol.
— *Starckeae* L. Bol.
— *surrectum* L. Bol.
Hakea vittata R. Br.
Hemigraphis repanda Hallier f.

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes ne sont pas répétées, sauf lorsqu'il s'agit de plantes d'importation directe.

- Hereroa Muirii* L. Bol.
Hymenocyclus purpureo-croceus L. Bol.
Ixora Finlaysoniana Wall.
Lampranthus palustris L. Bol.
Lepismium cruciforme Miq.
Lithops erniana Loesch. et Tisch.
— *Fulleri* N. E. Br.
— *Lericheana* Dtr. et Schwant.
— *Marthae* Loesch. et Tisch.
— *Peersii* L. Bol.
— *salicola* L. Bol.
Malvastrum tricuspdatum A. Gray.
Mamillaria aureiceps Lem.
— *Wiesingeri* Bödeker.
Monantheles muralis Christ.
Ophthalmophyllum griseum Tiny (suivant Johnson : *Catalogue*, p. 37).
— *Lydiae* Jacobs.
— *Triebneri* Schwant.
Oxalis rusciformis Mikan.
Phyllanthus lathyroides H. B. et K.
Rebutia Marsoneri Werderm.
— *minuscula* K. Schum. × *chrysacantha* Backeb.
Rhipsalis heteroclada Britt. et Rose.
— *puniceodiscus* G. A. Lind.
Ruellia subsessilis Lindau.
Sarracenia rubra Walt.
Sterculia platanifolia L. f.
Stylophyllum Orcuttii Rose.

MONOCOTYLÉDONES.

- Aerangis clavigera* Perr. de la Bât. Madagascar : plateaux de la région de Manandriana, vers Ambrosita (introduit et donné par *Lecoufle* f. 223, 1953).
Aerides falcatum Lindl. var. *Houlletianum* Veitch.
— — var. **Maurandii** Guillaum. var. nov. ¹ Annam : Langhanh Djiring (*C. R. S. T.*, n^o 2, f. 183, 1952).
— *Fieldingii* Lood. ex E. Morr.
Aloe deltoideodonta Bak. var. *contigua* Perr. de la Bât. form. *latifolia* Perr. de la Bât. s/form. *variegata* Boiteau, ex Guillaum. Madagascar (Boiteau, f. 227, 1939) ².
Aloe × **panormitana** Guillaum. hyb. nov. *brevifolia* ? × ? (*Jardin botanique de Palerme*, f. 134, 1953) ².
— *sempervivoides* Perr. de la Bât. Madagascar (*Léandri* f. 180, 1953).
Androcymbium palaestinum Bak. Lybie : Ghat (*Mission de Bearn : Alger-Le Cap*, 1952-1953). L'espèce qui n'avait été signalée qu'en Palestine et en Égypte est indiquée comme ayant des fleurs rosées ; en serre elles sont blanc pur et ne passent au rose qu'en se fanant (A. G.).

1. Voir *Bull. Mus.*, 1953, p. 329.

2. Voir *Bull. Mus.*, 1953, p. 187.

Angraecum compressicaule H. Perr. Madagascar (*Institut scientifique* f. 166, 1950, n° 2). Signalé en 1950 sous le nom de *Jumellea pachira* H. Perr.

Anthurium trifidum Oliv.

Brassia Lawrenceana Lindl.

Bulbophyllum cf. *cornutum* Reichb. f.

— *Everardii* Gagnep. Annam : Darlac (*Petit donné par VACHEROT* f. 204, 1948).

Cattleya × (*Gaskelliana* × *Frau Melanie Beyrodt*).

Chamaedorea Tepejilote Liebm.

Cleisostoma Sigaldiensis Guillaum. sp. nov.¹ Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 11 f. 183, 1952),

Coelogyne fimbriata Lindl. var. *annamica* Finet, Annam : Dalat (*C. R. S. T.* n° 289 Len, f. 210, 1953).

— *Huettneriana* Reichb. f. var. *lactea*.

Comparetta falcata Poepp. et Endl. Costa-Rica (donné par LACOUFLE, f. 168, 1950).

Cypripedium × *St Alban* Sander (*Antigone* × *Harrisianum*).

Dendrobium aducum Wall. Cochinchine (*C. R. S. T.*, n° 69/TS., f. 138 ; 1953).

Dendrobium caryaeolum Guillaum. sp. nov.² Cochinchine (*C. R. S. T.*, n° 65/TS., f. 138, 1953).

— *gracilicaule* F. Muell. Nouvelle-Calédonie (*Guillaumin*, f. 189, 1951).

— *heterocarpum* Wall. ex Lindl. Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 29, f. 189, 1952).

— *Jamesianum* Reichb. f.

— *Marseillei* Gagnep. Laos : Xieng-Kouang (*Marseille* donné par PINELLE, f. 325, 1933).

— *ramosum* Lindl.

— *tenellum* Lindl. Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 6, f. 183, 1952).

— *Wattii* Reichb. f. Annam : Dalat : Station Mauline (*C. R. S. T.*, n° 23, f. 183, 1952).

Doritis pulcherrima Lindl. Cambodge (*M^{me} Porée-Maspéro*, f. 172, 1950).

Epidendrum atropurpureum Willd. var. *roseum* Reichb. f.

Eria chrysobracteata Sehltr. Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 282/Lên, f. 210, 1953).

— *Eberhardtii* Gagnep. Annam : Dalat : Station Mauline (*C. R. S. T.*, n° 35, f. 183, 1952).

— *dalatensis* Gagnep. Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 14, pro parte, f. 183, 1952).

— *Everardii* Gagnep. Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 14, pro parte, f. 183, 1952).

— **Giungii** Guillaum. n. sp.³ Annam : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 10/SL, f. 182, 1953).

— *langbianensis* Gagnep. Annam : (Dalat *C. R. S. T.*, n° 13/SM, f. 210, 1953).

1. Voir *Bull. Mus.*, 1953, p. 329.

2. Voir *Bull. Mus.*, 1953, p. 331.

3. Voir *Bull. Mus.*, 1953, p. 510.

- **monantha** Guillaum. sp. nov. ¹. Annam : Dalat : Arbre broyé (C. R. S. T., n° 16, f. 183, 1952).
- E. paniculata* Lindl. Annam : Dalat (C. R. S. T., n° 6/SM, f. 210, 1953).
Le coloris de la fleur correspond exactement à la planche de King et Pantling ; les feuilles sont charnues et triangulaires en coupe et non granimiformes et rubannées comme il est dit dans la *Flore d'Indochine l. c.*, p. 349.
- Eulophia Ledienii* Stein. Guinée française : Foulaya (I. F. A. C., f. 109, 1953).
- Gasteria Armstrongii* Schönl.
- Gomezia crispa* Klotsch et Reichb. f. Brésil (donné par VACHEROT, f. 140, 1953).
- Haworthia Engleri* Dinter.
- *granulata* Marloth.
- *Ryderiana* Poelln.
- *tenera* var. *major* Poelln. = *H. minima* var. *major* (suivant Marnier-Lapostolle : *Catalogue du Jardin botanique Les Cèdres*, p. 45).
- × *Laeliocattleya Acis* Sander (*Cattleya Mendellii* Hort. × *Laelia tenebrosa* Rolfe).
- Luisia teretifolia* Gaud. Indochine : Lang-Bian ou région de Dalat (*Lemai*, f. 92, 1952).
- Lycaste leucantha* Klotzsch.
- Masdevallia ophioglossa* Reichb. f.
- Mormodes Lawrenceana* Rolfe.
- Nidularium Antoineum* Wawra.
- Nidularium* × *François Spae* Hort. Gyselink. (*striatum* Hort. Bull. × *fulgens* Lem.).
- *Lubbersii* Hort. Leod.
- Odontoglossum Kramerii* Reichb. f.
- Oncidium ansiferum* Reichb. f. Guatémala : au-dessus de 800 m. (donné par LECOUFFLE, f. 223, 1953). Diffère des descriptions et figures par l'absence de ponctuations sur les ailes de la colonne.
- *tetraskelidion* Kränzl. Costa-Rica (donné par LECOUFFLE, f. 168, 1950). Kränzlin (*Pflanzenreich* IV, 50, *Odontoglost.* pars II, p. 259, dit que les fleurs sont concolores jaune ± vif ; les fleurs sont, en réalité jaune franc mais avec des barres brunâtres très pales à la base des pétales et les lobes latéraux du labelle et la base de l'isthme du lobe médian sont légèrement teintés de brun comme le montre sa figure p. 271, C. a.
- Pescatorea cerina* Reichb. f. Costa-Rica (donné par LECOUFFLE, f. 169, 1950).
- Phajus pulchellus* Kränzl. Madagascar : Cultivé au Jardin botanique de Tananarive (MILLOT, f. 70, 1950). Sépales et pétales rosés, labelle blanc à crêtes très légèrement jaunes avec, extérieurement, une tache verdâtre virant au jaune vers la base des lobes latéraux AG.
- Pholidota articulata* Lindl. route de Saïgon à Dalat (C. R. S. T., n° 67/TS, f. 138, 1953) [ROSE déterm.]. Fleurs blanches à peine rosées, labelle à crêtes rose ochracé pâle, lobes latéraux et base du terminal jaunes.
- Polystachya cultriformis* Lindl. ex Spreng. Madagascar : région de Manandriana (cultivé à Tourcoing chez M. SION, f. 149, 1953). Espèce abon-

1. Voir *Bull. Mus.*, 1954, p. 132.

- dante à Madagascar, aux Comores et aux Mascareignes ; a, typiquement, les fleurs blanc verdâtre ; il y en a une variété **violacea** Guillaum. var. nov. dont les pièces du périanthe sont violacées avec les nervures et les bords plus clairs. Elle provient de la région de Manandriana et est cultivée à Tourcoing chez M. SION. A. G.
- *laxiflora* Lindl. Guinée française : Ziania, 1200 m. (ADAM, f. 1, 1950, n° 2), Foulaya (*I. F. A. C.*, f. 125, 1950).
- Prescottia micrantha* Lindl. Brésil : São Paulo (BESNARD, f. 163, 1951).
- Sarcochilus uniflorus* Gagnep. Annam. : Dalat (*C. R. S. T.*, n° 1, f. 183, 1952).
- Saccolabium albo-lineatum* Teijsm. et Binn. Saïgon : (*C. R. S. T.*, f. 18, 1953).
- Sarcanthus dealbatus* Reichb. f. Philippines (provenant de l'Exposition coloniale, donné par la *Ville de Paris*).
- Staurochilus fasciatus* Ridl. Route de Saïgon à Dalat (*C. R. S. T.*, n° 94/TS, f. 138, 1953).
- *undulatus* Benth. ex Hook. f.
- Thelasis pygmaea* Lindl. Cochinchine (*C. R. S. T.*, n° 64/TS, f. 138, 1953).
- Thrixspermum Centipeda* Lour. Route de Saïgon à Dalat (*C. R. S. T.*, n° 95/TS, f. 138, 1953).
- Tillandsia bryoides* Griseb.
- *bulbosa* Hook.
- Tradescantia fuscata* Lodd.
- Trichopilia Galeottiana* Rich.
- Tridactyle tridactylites* Schltr. Guinée française : Fouta (*I. F. A. C.*, n° 57, f. 125, 1950).
- Typhonium divaricatum* Dene.
- Vanda* × *Miss. Joachim* Ridley (*Hookeriana* × *teres*).